



Fábrica Nacional de Productos Químicos S.A.

Avda. César Mayo Gutiérrez 2305/29
Tel.: 2320 0511 - 2320 9618 Fax: (598) 2320 0640, Montevideo
fanapro@adinet.com.uy / www.fanaproqui.com.uy

Administración y Ventas:

Ruta 1 Km. 24 - Tel.: 2347 2035* - Fax: (598) 2347 2127
E-mail: ventas@isusa.com.uy - San José, Uruguay



Fanavid Flowable

Composición: Oxiclورو de cobre 68% p/v (expresado en cobre metálico 40% p/v).

Formulación: Suspensión concentrada acuosa (flowable)

Modo de acción: actúa por contacto. Acción preventiva.

Presentación: envase de 4l y 20l

Oxiclورو de cobre 40% p/v de cobre metálico, con mejorada formulación que le permite:

- Mayor adherencia y efectividad al disminuir el tamaño de partícula (70% menor a 2 micras).
- Mayor cobertura (1 gr. de producto cubre 6m² de superficie foliar).
- Menor costo de aplicación (menor dosis por ha. para mantener la misma eficacia que oxiclورuros comunes).

Cultivo	Enfermedad		Dosis cc. cada 100 lt	Época y frecuencia de aplicación
	Nombre Común	Organismo Casual		
Vid	Mildiu	Plasmópara vitícola	300 a 350 550 a 700	Aplicar cuando los brotes tienen 10 cm. De largo, repitiendo cada 7 - 10 días o cuando el Servicio de Advertencia lo indique. No aplicar en floración. Para lograr un adecuado sazonado de los sarmientos, aplicar un mínimo de dos tratamientos antes o después de la vendimia.
Citrus	Podredumbre parda	Phytophthora spp Sphaceloma fawcetti Phomopsis citri Colletotrichum Gloesporoides	350 a 550	Desde botón floral cerrado hasta después del cuajo (3 manos): 1ª prefloral, la 2ª a la caída de los pétalos, y la 3ª una vez cuajada la fruta.
	Sarna		350 a 550	Primera aplicación en prefloración, segunda aplicación a caída de pétalos, tercera aplicación 20 días después.
	Melanosis		350 a 550	Idem sarna
	Antracnosis		350 a 550	Idem sarna
Manzano	Sarna	Venturia inaequalis	350 a 550	Aplicar en punta plateada a punta verde (antes de la floración).
Peral	Sarna	Venturia pirina	350 a 550	Aplicar a yema hinchada (antes de floración).
Membrillo	Mancha ocular	Entomosporium maculatum	250 a 600	Aplicar a yema hinchada (antes de floración): dosis más altas. Desde inicio de floración a fruto formado, mínimo 3 aplicaciones, cuando los frutos comienzan a madurar y hasta la cosecha, cada 10 días dosis menores.
Duraznero	Torque	Taphrina deformans	800	Pulverizar cuando comienza la apertura de escamas de las yemas (antes de la floración). Aplicación otoñal, al tener el árbol el 50 % de su follaje en el suelo.
Papa	Tizón tardío	Phytophthora infestans	250 a 350	Desde que la planta tiene 10 cm de altura, aplicaciones periódicas cada 7 a 14 días. Idem Tizón Tardío
	Tizón temprano	Alternaria solani	250 a 350	
Tomate	Tizón tardío	Phytophthora infestans	250 a 350	Idem Tizón Tardío
	Tizón temprano	Alternaria solani	250 a 350	Idem Tizón Tardío
	Viruela	Septoria lycopersici	250 a 350	Idem Tizón Tardío
Cebolla	Mildiu	Peronóspora destructor	250 a 350	Desde que la planta tiene 10 cm de altura, aplicaciones periódicas cada 7 a 10 días.