FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 02

Fecha de revisión: 06/11/2026

Descripción general: Fertilizante foliar con boro complejado y suplementado con algas *Ascophyllum nodosum*

Nombre comercial: **FANAFOL BORO 8**

Registrado y comercializado por: FANAPROQUI S.A.



INDUSTRIA NACIONAL
Fabricado por FANAPROQUI S.A.

GENERALIDADES

El Fanafol Boro 8 es un fertilizante foliar que aporta a sus cultivos boro en forma complejada para asegurar una penetración y metabolización completa de este nutriente.
Contiene además extractos de alga *Ascophyllum nodosum* en una justa proporción que acelera los efectos catalíticos en el interior de las células, incrementando la permeabilidad de las mismas y aumentando todas las funciones bioquímicas de la planta: absorción, asimilación, síntesis y acumulación de reservas. Además, las algas presentan la capacidad de vivir en ambientes hostiles, debido a la generación de mecanismos de defensa que son los que van a ser trasladados a las plantas a través de su aplicación, ayudándolas a resistir a condiciones de estrés.

FÓRMULA

Ácido bórico
Monoetanolamina
Algas *Ascophyllum nodosum*
Agua

FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 02

Fecha de revisión: 06/11/2026

CARACTERÍSTICAS	
Estado físico	Líquido
Tipo de formulación	Concentrado soluble
Densidad	1.26 g/mL
pH	7.7
Color	Marrón oscuro - negro
Solubilidad	Total en H_2O
Conductividad	196 µS/cm a 1g/L

COMPOSICIÓN	VALOR (% p/p)
(3 – 0 / 0 – 0) + 8% B	
Contenido de boro (B)	8
Contenido de nitrógeno total (N)	3

PRESENTACIONES

1L, 5L, 10L, 20L

FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 02

Fecha de revisión: 06/11/2026

USOS RECOMENDADOS

Ámbito de aplicación foliar y apto para fertirriego.
Fertilizante foliar formulado para prevenir y/o corregir las deficiencias de boro en el cultivo. Es un complemento a la fertilización basal.
Se recomienda su aplicación en cultivos extensivos y en cultivos hortifrutícolas.
El momento fenológico en el cual se usa el Fanafol Boro es floración para mejorar el porcentaje de cuajado de los cultivos y obtener un mayor rendimiento a cosecha.
Las dosis foliares recomendadas a aplicar van desde 0.5 l/ha hasta 2 l/ha según cultivo, etapa fenológica y exigencias de la planta.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse en su envase original, herméticamente cerrado, en depósito adecuado, seco, techado y alejado de materiales incompatibles (agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos y bases fuertes, cloruros o anhídridos de ácido, monómeros (compuestos insaturados como los epóxidos, cloruro de vinilo, acetato de vinilo, acroleína o acrilonitrilo), aluminio, cobre, aleaciones de cobre, nitrato de celulosa, hierro galvanizado).
No dejar a la intemperie, ni exponer a temperaturas elevadas. Siempre almacenar bajo techo, nunca dejar al sol. Resellar o cerrar bien los envases inmediatamente después de su uso.
Mantener lejos del alcance de los niños y personal no autorizado. Almacene lejos de alimentos y bebidas.